

CTCCS

Grandes



Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt

Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE

10 rue du séminaire 94516 RUNGIS cedex Tél: 01-41-73-48-00 Fax: 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gérant : N. THERRE

Publication périodique C.P.P.A.P n°0909 B 07113 ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2008: 87 euros (papier) 76 euros (fax) 68 euros (mail)

AVERTISSEMENTS 107-3-08013424 AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 05 du 5 mars 2008 - 1 page

Actualité

STADES:

BLE : tallage - épi 0,5 à 1 cm pour les premiers.

COLZA: élongation plus ou moins prononcée. Boutons cachés (D1) à visibles (D2).

ORGE PTPS: levée

POIS-FEVEROLE: germination à levée.

Ravageurs colza

L'activité des ravageurs est restée très limitée la semaine passée, avec la dégradation météorologique. Pour les charançons de la tige, des rares captures (1 ou 2 insectes), ont été relevées dans quelques cuvettes (Château Landon-77, Saint Vrain, Ballancourt, Abbeville la rivière, Janvry-91, Mondreville-78, Nucourt-95..). Des piqûres ont été observées dans les sites où des captures sont enregistrées depuis 4 semaines comme à Saint Vrain et Janvry (91). On est dans une année délicate à gérer avec une activité discontinue de ravageur au gré de la météo, et des stades de colza très hétérogènes dans une même parcelle.

Pour les méligèthes, lorsqu'ils sont présents, le niveau d'attaque reste très faible (1 à 4 pour 20 plantes). La situation ne devrait guère évoluer avec les conditions fraiches et perturbées annoncées.

Thrips

Sur les premiers pois en cours de levée, on note déjà une présence significative de thrips (1 à 2 par plantes). C'est le cas par exemple à Egreville, Château Landon-77, Abbeville la rivière, Les Granges le Roi-91....).

Pour observer les thrips, utilisez soit une loupe, soit un sac transparent ou un flacon hermétique dans lequel vous mettez des plantes. A la chaleur, les thrips se collent à la paroi.

Seuil d'intervention : au moins 1 thrips par plante de la levée à l'étalement des premières feuilles.

Rouille jaune.

Nos collègues du Nord - Pas de Calais signalent à leur tour une présence exceptionnellement précoce de rouille jaune, avec dans certains cas des attaques sévères. Les variétés touchées sont notamment Toisondor, Perfector, Dinosor, Koréli, Pépidor, Robigus, Hysun, Selekt...

SET

DS 5° 00.58755

Dans le Val d'Oise, la Chambre d'Agriculture signale quelques symptômes sur une parcelle de Caphorn et d'Allixan.

En bref

Désherbage céréales

Quelques désherbages de sortie hiver ont été réalisés ces derniers jours. Globalement, le salissement des parcelles (même non traitées à l'automne) semble plus modéré que l'an dernier. On trouve quand même des cas d'infestations fortes en graminées (vulpin, ray grass) ou gaillet.

Deux rappels réglementaires :

-une seule application par campagne de chlortoluron ou d'isoproturon sur la même parcelle,

- limitation à une seule application par campagne de l'une ou l'autre des molécules suivantes : mesosulfuron méthyl, iodosulfuron méthyl, flupyrsulfuron, sulfosulfuron, propoxycarbazone.

(ex des spécialités concernées : ATLANTIS – ARCHI-PEL – ALOES – ABSOLU – ATTRIBUT – HUSSAR – MONITOR – ALISTER – gamme LEXUS....).

Problèmes divers

Plusieurs techniciens font état de problèmes de mosaïque sur des parcelles d'orge. Soupçons également de viroses (pieds chétifs, JNO?) sur des blés.

Dégâts de taupins sur un blé de jachère dans le secteur de Maison Rouge (77) entraînant le retournement de la parcelle (source : Soufflet Agriculture).

Chenilles processionnaires

Les chenilles processionnaires du pin sont un ravageur des résineux, sur lesquelles elles provoquent des défoliations. Elles sont surtout responsables de désagréments pour la population, en raison de leur caractère urticant.

Afin de mettre à jour notre cartographie de l'aire géographique de ce parasite, merci de nous signaler si vous observez à proximité de vos champs ou de vos habitations, des nids dans les résineux (nids blancs et soyeux à l'extrémité des branches du haut, le plus souvent), surtout pour les personnes du sud Seine et Marne, ou de l'est de l'Essonne